

Таблица 1. Морфологическая характеристика видов рода *Bracteacoccus*.

Table 1. Morphological features of *Bracteacoccus* species.

Виды	Вегетативные клетки			Зооспоры			
	Форма молодых клеток	Максимальный размер	Утолщение слизистой оболочки	Форма	Длина жгутиков	Положение стигмы	Положение ядра
<i>Bracteacoccus aerius</i>	Грушевидная, эллипсоидная, шаровидная	28 мкм	До 4,5 мкм	Эллипсоидная, яйцевидная	Неравная	Заднее	Переднее
<i>Bracteacoccus aggregatus</i> (= <i>B. cohaerens</i>)	Шаровидная, эллипсоидная, неправильная	55 мкм	Тонкая, до 4,5 мкм	Шаровидная, веретеновидная, грушевидная	Неравная	Срединное или заднее	Переднее
<i>Bracteacoccus bohemiensis</i>	Шаровидная, иногда неправильная	24 мкм	Не утолщается	–	Не набл.	–	–
<i>Bracteacoccus bullatus</i>	Шаровидная, яйцевидная	68 мкм	До 2,5 мкм	Веретеновидная, каплевидная	Неравная	Срединное или заднее	Переднее
<i>Bracteacoccus deserticola</i>	Шаровидная	46 мкм	До 4 мкм	Веретеновидная	Неравная	Срединное или заднее	Переднее
<i>Bracteacoccus giganteus</i>	Шаровидная	107 мкм	До 7,5 мкм	Веретеновидная	Неравная	Срединное	Переднее
<i>Bracteacoccus glacialis</i>	Шаровидная, эллипсоидная	34 мкм	До 1,8 мкм	Каплевидная	Неравная	Срединное	Переднее
<i>Bracteacoccus minor</i> (= <i>B. grandis</i> , <i>B. medionucleatus</i> , <i>B. minor</i> var. <i>desertorum</i>)	Шаровидная	85 мкм	Тонкая, с возрастом заметно не утолщается	Веретеновидная, серповидная, шаровидная	Неравная	Срединное или заднее	Переднее
<i>Bracteacoccus occidentalis</i>	Шаровидная, яйцевидная	40 мкм	Слегка утолщается	Сплюснутая	Неравная	Срединное или заднее	Переднее
<i>Bracteacoccus polaris</i>	Шаровидная	16 мкм	Не утолщается	Удлиненная	Неравная	Срединное	Переднее
<i>Bracteacoccus pseudominor</i>	Шаровидная	25 мкм	–	Яйцевидная	Неравная	Заднее	Срединное
<i>Bracteacoccus ruber</i>	Шаровидная	60 мкм	5 мкм	–	Не набл.	–	–
<i>Bracteacoccus xerophilus</i>	Шаровидная	26 мкм	Не утолщается	–	Не набл.	–	–

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных.

Note. «–» absence of data.